

Бустерная вакцинация против COVID-19

Бустерная вакцинация против COVID-19 – введение одной дозы вакцины через 6 и более месяцев после законченной первичной вакцинации или после ранее проведенной бустерной вакцинации.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных и безопасных средств защиты и профилактики заболевания COVID-19, так как она снижает скорость передачи вируса, уменьшает вероятность тяжелой формы заболевания, а также последствий:

дыхательная недостаточность, легочная тромбоэмболия, сердечная аритмия и церебральный инсульт и др.

После перенесённого заболевания COVID-19 вакцинация может быть сделана после выздоровления:

- В лёгкой форме – не ранее через 2 недели после выздоровления;
- В среднетяжёлой форме – не ранее чем через 4 недели;
 - В тяжёлой – не ранее чем через 6 недель;
- В тяжелой форме с осложнениями – не ранее, чем через 8 недель.

Порядок проведения бустерной вакцинации представлен на схеме:

Контингент	Основная (первичная) Вакцинация	Бустер через 6 месяцев
лица 18 лет и старше	СПУТНИК V (две дозы) SINOPHARM (две дозы) иной ИЛП согласно инструкции (одна или две дозы)	СПУТНИК ЛАЙТ/СПУТНИК V (любой из компонентов – 1 доза) SINOPHARM* <i>*для беременных и кормящих женщин, а также для лиц в случае выявления в ходе вакцинации против COVID-19 (основной (первичной) или бустерной) у пациента побочных (нежелательных) реакций на введение вакцины.</i>
	СПУТНИК ЛАЙТ (одна доза)	СПУТНИК ЛАЙТ/СПУТНИК V (любой из компонентов – 1 доза)